

Pripravak	Form.	Djelatne tvari u g/l	Proizvodi Distribuiraju	Koncentracija ili doza (kg, l/ha) / za suzbijanje
Systhane 24 E	EC	234 miklobutanil	Dow AgroSciences AgroChem Maks	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>vinova loza</b> → 0,01-0,0125% - <i>pepelnica</i> i <i>crna trulež</i>;</li> <li>• <b>voćne vrste</b> → 0,02-0,03% - <b>jabuka</b> - <i>čađava krastavost</i> i <i>pepelnica</i>, <b>breškva</b>, <b>nektarina</b> i <b>marelica</b> - <i>pepelnica</i>, <b>šljiva</b> i <b>kupina</b> - <i>hrđa</i>, <b>koštičave voćke</b> - <i>trulež plodova</i> i <i>sušenje mladica</i>;</li> <li>• <b>ruže</b> i <b>karanfili</b> → 0,025-0,05% - <i>pepelnica</i>, <i>crna pjegavost</i> i <i>hrđe</i>;</li> <li>• <b>paprika</b>, <b>rajčica</b> i <b>artičoka</b> → 0,03-0,05% - <i>pepelnica</i>;</li> <li>• <b>tikva</b>, <b>krstavac</b> i <b>lubenica</b> → 0,03-0,05% - <i>pepelnica</i>.</li> </ul>
• <b>Karenca</b> - 14 dana krastavci; 21 dan jabuke; 35 dana vinova loza.				
Fond 12 E	EC	125 miklobutanil	Chromos Agro	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>vinova loza</b> → 0,016-0,02% (prije cvatnje), a 0,025% (poslije cvatnje) - <i>pepelnica</i>, <i>crna trulež</i>;</li> <li>• <b>jabuka</b> i <b>kruška</b> → 0,035-0,06% - <i>čađava krastavost</i> i <i>pepelnica</i> jabuke;</li> <li>• <b>ukrasno bilje</b> → 0,05-0,1% - <i>pepelnica</i>, <i>crna lisna pjegavost</i>, <i>hrđa</i> (na ružama i karanfilima);</li> <li>• <b>tikva</b>, <b>krstavac</b> i <b>lubenica</b> → 0,06-0,1% - <i>pepelnica</i> (<i>Erysiphe cichoracearum</i>);</li> <li>• <b>paprika</b>, <b>rajčica</b> i <b>artičoka</b> → 0,06-0,1% - <i>pepelnica</i> (<i>Leveillula taurica</i>).</li> </ul>
Systhane 12 E	EC	125 miklobutanil	Dow AgroSciences AgroChem Maks	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>vinova loza</b> → 0,016-0,02% (prije cvatnje), a 0,025% (poslije cvatnje) - <i>pepelnica</i>, <i>crna trulež</i>;</li> <li>• <b>jabuka</b> i <b>kruška</b> → 0,035-0,06% - <i>čađava krastavost</i> i <i>pepelnica</i> jabuke;</li> <li>• <b>ukrasno bilje</b> → 0,05-0,1% - <i>pepelnica</i>, <i>crna lisna pjegavost</i>, <i>hrđa</i> (na ružama i karanfilima);</li> <li>• <b>tikva</b>, <b>krstavac</b> i <b>lubenica</b> → 0,06-0,1% - <i>pepelnica</i> (<i>Erysiphe cichoracearum</i>);</li> <li>• <b>paprika</b>, <b>rajčica</b> i <b>artičoka</b> → 0,06-0,1% - <i>pepelnica</i> (<i>Leveillula taurica</i>).</li> </ul>
• <b>Karenca</b> - 14 dana za krstavce; 35 dana za jabuke i vinovu lozu.				
Postalon 90 SC	EC	45 miklobutanil + 45 kinoksifen	Dow AgroSciences Chromos Agro	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>vinova loza</b> → 0,1-0,125% - <i>pepelnica</i>.</li> </ul>
• <b>Karenca</b> - 35 dana vinova loza.				
Sabithane	EC	75 miklobutanil + 325 dinokap	Dow AgroSciences AgroChem Maks	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>vinova loza</b> → <ul style="list-style-type: none"> <li>• a) 0,03% prije cvatnje;</li> <li>• b) 0,035% poslije cvatnje;</li> <li>• c) 0,04% kurativno tretiranje - <i>Uncinula necator</i>;</li> </ul> </li> <li>• <b>krstavci</b>, <b>lubenice</b>, <b>tikve</b> → 0,045% - <i>pepelnice</i>: <i>Erysiphe cichoracearum</i>, <i>Sphaerotheca fuliginea</i> (primjenjuje se samo do prve cvatnje);</li> <li>• - sekundarno djelovanje koje sprječava razvitak grinja!</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ograničenje</b> - Ne prskati kada su temperature iznad 28°C.</li> <li>• <b>Karenca</b> - 42 dana vinova loza, krstavci i drugo povrće do prve cvatnje.</li> </ul>				