

Pripravak	Form.	Djelatne tvari g/l i g/kg	Proizvodi Distribuiraju	Koncentracija ili doza (kg, l/ha) /za suzbijanje
Callifos 48 EC	EC	480 klorpirifos-etil	Arysta AgroChem MAKS H.E.D.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>nasadi voćaka</b> → 0,15% - lisne uši, gusjenice dudovca, gubar, savijača pupova, jabučni cvjetar i kruškine lisne buhe;</li> <li>• <b>ratarske biljke</b> → (1-1,5 l/ha) - lisne uši; → 2 l/ha uz utrošak vode od 400-600 l/ha - krumpirova zlatica, atomarija, žitna stjenica i lisne sovice;</li> </ul>
Dursban E-48	EC	480 klorpirifos-etil	Dow Agrosciences Chromos Agro	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>duhan</b> → 0,15% - sovica pozemljuša i zelene breskvine uši;</li> </ul>
Finish E-48	EC	480 klorpirifos-etil	Chromos Agro	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>štetnici u tlu</b> → 6-8 l/ha - žičnjaci, grčice hrušta, rovci i sovice.</li> </ul>
Pirifos EC	EC	480 klorpirifos-etil	Cheminova A/S Herbos	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Karenca</b> - 28 dana za voćke, šećernu repu i krumpir; 42 dana za ratarske usjeve. Kod prskanja tla iznosi 42 dana za kupusnjače i ostalo povrće, 63 dana za luk i 91 dan za krumpir.</li> </ul>				
Pyrinex 250 ME	EC	250 klorpirifos-etil	Makhteshim Danon Fitopromet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>jabuka</b> → 0,2-0,3% - jabučni savijač;</li> <li>• <b>uljana repica</b> → 2 l/ha - repičin sjajnik i repičina pipa komušarica.</li> </ul>
Chromorel - D	EC	500 klorpirifos-etil + 50 cipermetrin	Agriphar S.A. Chromos Agro	<ul style="list-style-type: none"> <li>• u nasadima <b>jabuka i krušaka</b> → 0,075-0,1% odnosno 7,5-10 ml u 10 l vode - lisne uši (<i>Aphididae</i>) i jabučni savijač (<i>Carpocapsa pomonella</i>); → 0,1-0,15% - kruškina buha (<i>Psylla pyri</i>);</li> </ul>
Kalinorel D	EC	500 klorpirifos-etil + 50 cipermetrin	Veterina Kalinova	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>šećerna repa</b> → 1,5-2 l/ha uz utrošak vode 300-600 l/ha, odnosno 15-20 ml u 3-6 l vode na 100 m<sup>2</sup> - repine pipe (<i>Bot-hinoderes punctiventris</i>); → 1-1,5 l/ha uz utrošak vode 300-600 l/ha, odnosno 10-15 ml u 3-6 l vode na 100 m<sup>2</sup> - lisne sovice (<i>Mamestra</i> spp.);</li> </ul>
Nurelle D	EC	500 klorpirifos-etil + 50 cipermetrin	Agriphar S.A. AgroChem Maks	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>uljana repica</b> → 0,75-1 l/ha, uz utrošak vode 300-600 l/ha, odnosno 7,5-10 ml u 3-6 l vode na 100 m<sup>2</sup> - repičin sjajnik (<i>Meliphetes aeneus</i>);</li> </ul>
Pinurel D	EC	500 klorpirifos-etil + 50 cipermetrin	Pinus TKI Pinus Agro	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>krumpir</b> → 0,6-0,9 l/ha - krumpirova zlatica (gdje nema rezistentnih sojeva!);</li> </ul>
Pirel-D	EC	500 klorpirifos-etil + 50 cipermetrin	Herbos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pinurel D: <b>vinova loza</b> → 0,5-0,8 l/ha - za suzbijanje sivog i žutog grozdovog moljca..</li> </ul>
Terel	EC	500 klorpirifos-etil + 50 cipermetrin	Sinochem AgroChem Maks	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ograničenja</b> - Primjena iz zrakoplova nije dopuštena. Zbog vrlo izražene perzistentnosti klorpirifosa, ne preporuča se primjena na izrazito erozivnim kosim površinama. Sredstvo se može najviše dva puta upotrijebiti na istoj površini nasada u toku jedne godine. Ne smije se koristiti u vrijeme cvatnje.</li> <li>• <b>Miješanje</b> - Ne preporuča se miješanje s bordoškom suspenzijom, kositrenim fungicidima i fungicidima na osnovi dodina.</li> <li>• <b>Karenca</b> - 21 dan krumpir; 28 dana jabuka, kruška i šećerna repa; 56 dana uljana repica. Radna karenca: nije dopušten rad 72 sata nakon primjene u aridnim područjima i 48 sati nakon primjene u ostalim područjima.</li> </ul>				